Вопросы программы для рубежного контроля - 1

Название ОП: «Общая медицина»
Код дисциплины: Ftiz 5305
Название дисциплины: Фтизиатрия
Объем учебных часов/кредитов: 120/4
Курс и семестр: 5/9

Составитель: 1. Касаева Л.Т. – и.о. доцента, заведующая кафедрой
2. Серхожаева Т.Х. – ассистент кафедры

Заведующая кафедрой Касаева Л.Т.
Протокол №11 Дата 26.06.2025

Шымкент-2025

Вопросы для студентов 5 курса «Общая медицина» по фтизиатрии, 200 вопросов
Рубежный контроль -1

1. К группам населения повышенного медицинского риска по туберкулезу не относятся...
2. Для выявления возбудителя туберкулеза наиболее чувствительным является ... метод.
3. Дообследование при выявлении легочной патологии флюорографическим методом должно проводиться в течение…
4. Обязательным клиническим минимумом при обследовании на туберкулез легких не является …
5. Бактериоскопическому исследованию мокроты на микобактерии туберкулеза подлежат ...
6. Проба Манту с 2 ТЕ считается положительной при размерах папулы не менее... .
7. Проба Манту с 2 ТЕ у взрослых считается гиперергической при размерах папулы не менее... .
8. Простой бактериоскопией в 1 мл мокроты обнаруживаются микобактерии туберкулеза в количестве ... микробных тел.
9. Методом люминесцентной микроскопии в 1 мл мокроты обнаруживаются микобактерии туберкулеза в количестве ... микробных тел.
10. Методом посева в 1 мл мокроты обнаруживаются микобактерии туберкулеза в количестве... микробных тел.
11. Методом флотации в1 мл мокроты обнаруживаются микобактерии туберкулеза в количестве... микробных тел.
12. Наиболее часто поражаются при туберкулезе легких у взрослых ...сегменты.
13. Ранняя туберкулезная интоксикация это - ... .
14. Поражение... является морфологическим субстратом ранней туберкулезной интоксикации.
15. К ранней туберкулезной интоксикации относят процессы с длительностью до... .
16. К хронической туберкулиновой интоксикации относятся процессы с длительностью более... .
17. К признакам хронической туберкулезной интоксикации не относится... .
18. Наиболее характерные формы первичного туберкулеза... .
19. Формы внелегочного туберкулеза наиболее характерны для первичного периода туберкулезной инфекции это - ... .
20. Наиболее характерными изменениями периферической крови при первичном туберкулезе являются -... .
21. Следующая рентгенологическая картина: легочные поля без очаговых и инфильтративных теней, корни имеют нормальный размер, форму и структуру характерна для ... .
22. Рентгенологически наиболее чаще с перифокальным воспалением протекает туберкулез ... лимфоузлов.
23. Клинико-рентгенологические признаки не характерные для поражения бронхов при первичном туберкулезном комплексе и бронхоадените ... .
24. К условиям для возникновения диссеминированного туберкулеза легких не относятся... .
25. Наиболее частый источник диссеминации в легких, это- ... .
26. Диссеминированный туберкулез легких, это ... .
27. При диссеминированном туберкулезе часто наблюдается... .
28. Острый диссеминированный туберкулез легких, это ... .
29. При милиарном туберкулезе рентгенологически отмечаются ... .

30. При подостром диссеминированном туберкулезе рентгенологически отмечаются ... .
31. Бактериовыделение при хроническом диссеминированном туберкулезе легких чаще … .
32. Основным методом выявления очагового туберкулеза у взрослых является … .
33. Наиболее характерные данные перкуссии и аускультации при мягкоочаговом туберкулезе-... .
34. Наиболее характерные данные перкуссии и аускультации при фиброзно-очаговом туберкулезе-... .
35. Часто наблюдаются при мягко-очаговом туберкулезе легких в периферической крови- ... .
36. Наличие МБТ в мокроте при мягко-очаговом туберкулезе без распада... .
37. Инфильтративный туберкулез легких характеризуется... .
38. Для округлых и лобулярных инфильтратов без распада характерна …
39. Рентгенологически при облаковидном инфильтрате в фазе распада определяется... .
40. Рентгенологически при округлом инфильтрате без распада определяется … .
41. Рентгенологическая картина при туберкулеме... .
42. Клинико-рентгенологические варианты туберкулем... .
43. Рентгенологические признаки стабильной туберкулемы... .
44. Рентгенологические признаки прогрессирующей туберкулемы, это... .
45. Рентгенологические признаки регрессирующей туберкулемы ... .
46. Наиболее характерные лабораторные данные при стабилизированных туберкулемах ... .
47. Изменения гемограммы, характерные для прогрессирующей туберкулемы это ... .
48. Симптом наиболее характерный для миллиарного туберкулеза - ... .
49. Самая частая клиническая форма туберкулеза у подростков... .
50. Сбор мокроты для микроскопии мазка на МБТ необходимо производить... .
51. Туберкулезный лобит это ... .
52. Диссеминированный туберкулез легких может осложниться... .
53. Инспираторная одышка-это... .
54. Наиболее информативный метод в диагностике очагового туберкулеза легких - это... .
55. Активность туберкулезного процесса характеризует ...
56. Обнаружить кислотоустойчивые штаммы позволяет метод окраски ... .
57. К типичным клиническим формам первичного туберкулеза у подростков НЕ ОТНОСИТСЯ ... .
58. Характер плеоцитоза при туберкулезном менингите... .
59. При активном очаговом туберкулезе рентгенологически наблюдаются... .
60. На фоне... в легких чаще всего возникает инфильтративный туберкулез.
61. Диссеминированный туберкулез часто приходится дифференцировать с... .
62. В течении туберкулезного менингита можно выделить три периода... .
63. Расстройства функции тазовых органов встречаются при... .
64. По патогенезу очаговый туберкулез легких представляет... .
65. Рентгенологическая картина,характерная для бронхолобулярного инфильтрата ... .
66. Рентгенологическая картина при казеозной пневмонии... .
67. Развитию инфильтратов наиболее часто предшествует... .
68. Наиболее частым исходом неосложненного первичного туберкулезного комплекса является ...
69. К эпидемиологическим показателям туберкулезной инфекции среди населения не относятся ... .

70. Миллиарный туберкулез необходимо дифференцировать с... .
71. Длительность продромального периода при туберкулезном менингите... .
72. Одышка, "лающий" приступообразный кашель характерны для... .
73. Диссеминированный туберкулез легких может осложниться... .
74. Основными симптомами острого диссеминированного туберкулеза легких являются ... .
75. При туберкулезе внутригрудных лимфоузлов причиной бацилловыделения является... .
76. Типичная локализация легочного аффекта при первичном туберкулезном комплексе... .
77. Тоны сердца при хронической туберкулезной интоксикации... .
78. .Медработник отвечает за то, чтобы образцы мокроты были отправлены в лабораторию не позднее... .
79. Течение регрессирующей туберкуломы легких, это -... .
80. Характерная бронхографическая картина при туберкуломе легких... .
81. Прикорневой инфильтрат- это ... .
82. Для течения прогрессирующей туберкуломы характерны... .
83. Интенсивное затемнение, связанное дорожкой с расширенным корнем,рентгенологически характерно для... .
84. Для микробиологического обнаружения МТ патологическим материалом не является …
85. Основным видовым признаком микобактерий туберкулеза является… .
86. К биохимической характеристике микобактерий туберкулеза относятся:
87. МБТ в кальцинатах сохраняются в виде... .
88. К клиническим формам туберкулеза первичного генеза не относится … .
89.У больных с прогрессирующим очаговым туберкулезом легких над зоной поражения чаще выслушивают …
90.Активность очагового туберкулеза подтверждает …
91.Выделяют следующие формы очагового туберкулеза …
92.Причина появления мелкопузырчатых влажных хрипов приочаговом туберкулезе …
93.Наиболее вероятный исход при адекватном лечении больного свежим очаговым туберкулезом …
94.Инфильтративному туберкулезу легких непосредственно предшествует …
95.Приинфильтративном туберкулезе в зоне поражения…
96.Одним из клинико-рентгенологических вариантов туберкулезного инфильтрата являетя …
97.Поражение туберкулезным воспалением расположенных рядом 2-3 долек отмечпают присформированном …
98.Поражение туберкулезным воспалением доли легкого соответствует …
99.При инфильтративном туберкулезе выраженность клинических признаков определяется …
100.У больных инфильтративным поражением легких кашель с окротой обычно появляется в случае …
101.Массивноевыделение МБТ обнаруживают при развитии в легком …
102.Неблагоприятным исходом инфильратривного туберкулеза легких является …
103. Результаты эффективного лечения облаковидного инфильтрата более часто являются …
104.Морфологичекая основа казеозной пневмонии …
105.Клинико-рентгенологическии формами казеозной пневмонии являются …
106.Особенностью казеозной пневмонии являются …
107.Ведущий патогенетический фактор развитияказеозной пневмонии …
108. Характер туберкулиновой чувствительности у больных казеозной пневмонией …
109. К основным группам внутригрудных лимфатических узлов по Сукенникову не относятся... .
110 … не является Клиническим симптомом инфильтративного бронхоаденита .

111. Прогрессирование легочного компонента первичного туберкулезного комплекса приводит к . . .
112..Группа лимфоузлов,которая наименее подвержена поражению у больных первичным туберкулезом. . .
113.Очаг Гона - это . . .
114. При первичном туберкулезе превалирует... фаза воспаления.
115. Очаг Симона- это . . .
116. К осложнениям туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов не относится. . . .
117. При прогрессирующем течении первичного туберкулезного комплекса осложнением может быть.
118. При защите организма человека от туберкулезной инфекции преобладают... .
119. Основным типом аллергической реакции при туберкулезе является. . . .
120. Не характерный признак для туберкулезного менингита- это ... .
121. В патогенезе очагового туберкулеза легких не бывает... .
122. К основным методам диагностики туберкулемы легких не относятся ... .
123. Туберкулема легких характеризуется ... .
124. Развитию туберкулемы легких наиболее часто предшествует ... .
125. На каждого впервые выявленного бациллярного больного заполняется экстренное извещение ... .
126. «Штампованные» каверны в легких характерны для ... .
127. Эпителиоидные клетки в туберкулезной гранулеме являются производными... .
128. Нехарактерными рентгенологическими синдромами для подострого диссеминированного туберкулеза легких являются ... .
129. Нехарактерные признаки острого диссеминированного туберкулеза легких: ... .
130. Начальным проявлением милиарного туберкулеза легких не является ...
131. При остром диссеминированном туберкулезе легких характерные рентгенологические изменения обнаруживаются... .
132. Наиболее частой внелегочной локализацией специфических изменений при подостром диссеминированном туберкулезе является... .
133. Синдром легочной диссеминации не имеет место при... .
134. Для базиллярной формы туберкулезного менингита характерны... .
135. Для туберкулезного менингита характерный цитоз... .
136. Для диагностики туберкулезного менингита не имеет значения... .
137. Содержание сахара в ликворе у больных туберкулезным менингитом... .
138. Для базиллярной формы туберкулезного менингита не характерно:... .
139. Содержание белка в ликворе у больных туберкулезным менингитом... .
140. Штампованные каверны в легких образуются при:
141. Характерным рентгенологическими признаками острого диссеминированного туберкулеза легких является все нижеперечисленные, кроме …
142. Для подострого диссеминированного туберкулеза легких характерно все,кроме
143. В дифференциальной диагностике диссеминированных процессов в легких наиболее информативным методом исследования является:
144. При подозрении на туберкулезный менингит лечение надо начинать:
145. Осложнениями инфильтративного туберкулеза легких являются:
146.Основным опасным для людей МБТ являются …
147.Один нелеченный заразный больной туберкулезом за год обычно инфицирует примерно … человек.
148.На вероятность заболевание туберкулезом практически не влияет …
149.Туберкулезом чаще болеют …
150.Туберкулез чаще встречается среди работников …
151.Туберкулез чаще развивается на фоне …

152. При ежегодной оценки эпидемиологической ситуацииопределяют общее число больных активным туберкулезом на 100 тыс. населения. Эти данные определяет показатель …

153.При ежегодной оценке эпидемиологической ситуацииопределяют число впервые выявленных больных туберкулезом на 100 тыс. населения. Эти данные определяет показатель …

154.Общий резервуар туберкулезной инфекции среди людей позволяет оценить показатель …

155.Распространение туберкулезной инфекции среди людей отражает показатель …

156.При прочих равных условиях вероятность заболеть туберкулезом особенно велика, если контакт с больным туберкулезом …

157.Среди социально неблагополучных граждан особенно часто заболевают туберкулезом …

158.Опасным для человека источником МБТ являются больные туберкулезом …

159.Главной причиной заболевания туберкулезом человека является …

160.Атипичные микобактерии могут вызывать у человека …

161.Микобактерии туберкулеза персистируют в организме …

162.Метод окрашивания по Цилю-Нильсену основан на свойстве МБТ …

163.Корд-фактор МБТ является … .

164.Антигенные свойства МБТ обеспечивают …

165.Оптимальная температура для активного размножения МБТ …

166.Основной путь заражения туберкулезом человека …

167.Строение туберкулезной гранулемы (бугорка) – это …

168.Основной путь элиминации МБТ при клеточном иммунитете - …

169.Наиболее характерные клетки для туберкулезной гранулемы …

170.Взаимодействие между Т-лимфоцитами и макрофагами осуществляется …

171.В развитии туберкулезной инфекции у человека принято выделять следующие периоды: …

172.При незавершенном фагоцитозе МБТ - …

173.Первичная облигатная бактериемия характерна для этапа …

174.Иммунитет при туберкулезе в основном …

175.Гиперчувствительность замедленного типа к МБТ обусловленна …

176.Появление и накопление в крови противотуберкулезных антител …

177.Первичный туберкулез – заболевание, которое возникает …

178.Формы первичного туберкулеза …

179. Первичный туберкулезный комплекс характеризуется …

180.При первичном туберкулезе параспецифические реакции нередко проявляются …

181.Рентгенологический синдром «биополярности» или «гантели» характерен для …

182.Инфильтративная форма туберкулезного бронхоаденита рентгенологически проявляется в виде …

183.Туморозную форму туберкулеза внутригрудных лимфаических узлов определяют в случае …

184.У больных с неосложненным течением первичного туберкулеза чувствительность к туберкулину чаще … .

185.… наиболее частое осложнение при туберкулезе внутригрудных лимфтических узлов у детей.

186.Наиболее частая локализация легочного компонента первичного туберкулезного комплекса ...

187.В патогенезе развития диссеминированного туберкулеза особое значение имеет …

188.Основной путь распространения МБТпри диссеминированном туберкулезе ..

189.Диссеминированный туберкулез представляет наиболее высокуюопасность при поражении …

190.Типичный морфологический признак очагов диссеминации при милиарном туберкулезе …

191.Рентгенологическая картина при при подостром варианте диссеминированного туберкулеза легких …

192.Рентгенологические признаки хронического варианта диссеминированного туберкулеза легких …

193.Обнаружение на рентгенограмме в обоих легких множественных ооднотипных очаговых теней малой интенсивности размером до 2 мм в сочетаниис обеднением легочного рисунка и размытостью тени корней легких подтверждает диагноз - …

194.Полиморфизм очагов при хроническом диссеминированном туберкулезе обусловлен …

195.Больных диссеминированным туберкулезом легких чаще беспокоит …

196.Под очаговой тенью понимают затемнение размером …

197. Отличительным морфологическим признаком очагового туберкулеза является …

198. Очаг Абрикосова – это …

199. Свежий очаговый туберкулез чаще обнаруживают при обследовании лиц …

200.Наиболее информативным методом выявления очагового туберкулеза является …